

## ABM®Anti-mCherry VHH Magarose

货号: MA111-25T



ABMagic™

### 产品信息

规 格: 500 μL 悬浮液

固含量: 50%

类 型: mCherry Tag 纳米抗体 (VHH) 磁性琼脂糖微珠

配 体: 抗 mCherry Tag 的纳米抗体 (VHH) , 羊驼来源

分子量: 15 KDa

结合力: 1 μL mCherry 磁性琼脂糖微珠混匀液结合约 2 μg 靶蛋白

反应性: 识别 N 端和 C 端 mCherry 或 mCherry 标记融合蛋白

亲和力: KD = 7.26 \* 10<sup>-9</sup> M

靶 标: mCherry、mRFP、mRFPuby、mPlum、tagRFP、mKate2 等, 不识别 GFP、EGFP、mNeongreen 等

应 用: IP, CoIP, RIP, ChIP, MS, Purification

储存液: 1x10 mM PBS, 25%甘油, 和 0.03% Proclin 300

微珠粒径: 30~100 μm (磁性琼脂糖微珠)

运输温度: 冰袋或常温运输

储存温度: 4°C (避免冻存) 有效期 1 年

### 产品说明

mCherry-VHH Magarose 是用于抓取或纯化 mCherry-Tag 融合蛋白的优势工具, 由抗 mCherry tag 的高亲和力纳米抗体 (单域抗体 VHH 区), 重组表达后共价结合在磁性琼脂糖微珠上, 抗体和磁珠不易分离且没有重轻链的影响, 广泛应用于: 动物、植物、细菌、真菌、组织细胞等中靶蛋白的捕获与检测。

### 产品优势

高特异性：条带单一，背景干净，没有普通抗体的重轻链影响

孵育时间短：通常 4°C 孵育 1~2 小时，容易降解的蛋白可 4°C 结合 5-30 min

高载量：1 μL slurry 可结合约 2 μg 靶蛋白

### 推荐缓冲液表（以 4-10°C PH 值为准）

Buffer	Composition
Lysis buffer (CoIP)	50 mM Tris-HCl pH7.5, 150 mM NaCl, 1% Triton-100, 0.5 mM EDTA, 0.5 % NP40
RIPA buffer	10 mM Tris-HCl pH7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.1% SDS, 1% Triton X-100, 1% Deoxycholate
Dilution/Wash buffer	50 mM Tris-HCl pH7.5, 150 mM NaCl, 0.5mM EDTA
2×SDS loading buffer	120 mM Tris-HCl pH6.8, 20% glycerol, 4% SDS, 0.04% Bromophenol blue, 10% β-mercaptoethanol
Glycine-elution buffer	200 mM glycine pH2.5
Neutralization buffer	1 M Tris pH10.4

### 缓冲液兼容表

Buffer ingredients	Max. concentration
DTT	5 mM
EDTA	5 mM
Glycerole	30%
NaCl	3 M
Gua-Hcl	3 M
NP40	2 %
SDS	0.1 %
Triton X-100	2 %
Urea	8 M

### 产品使用步骤

#### 一、样品准备

注：细胞裂解时应使用提前预冷的缓冲液。我们强烈建议在裂解缓冲液中添加蛋白酶抑制剂，以防止您的靶蛋白及其相互作用蛋白降解；细菌如大肠杆菌的裂解可采用化学法、机械法和超

**声波法等，此处省略。**

### **1.1 植物组织细胞裂解步骤：**

取适量植物组织样本放置于冷冻液氮中，将冷冻后的植物组织样本研磨成粉末，尽可能充分研磨破坏其细胞壁。加入 0.5-3 mL RIPA 裂解液（已加蛋白酶抑制剂 PMSF 等）进行裂解，为了提高裂解效率，加入 200  $\mu$ L 玻璃粉充分震荡 30 min，裂解完成后 14000x g 离心 10 min，吸取上清至新的离心管中，丢弃沉淀。

### **1.2 哺乳动物细胞收集步骤：**

每 10 cm<sup>2</sup> 培养皿约可收集 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> 个哺乳动物细胞，吸出生长培养基、向培养皿中加入 2 mL 提前预冷的 PBS (pH7.5) 洗涤细胞 2 次，利用胰酶消化的方法收集贴壁细胞，细胞转移到离心管，500x g 离心 5 min 并丢弃上清液，获得 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> 个细胞。

### **1.3 哺乳动物细胞裂解**

1. 在裂解缓冲液中加入蛋白酶抑制剂，用 200-500  $\mu$ L 预冷 Lysis buffer 重悬细胞。

注：对于细胞质蛋白在 Lysis buffer 中加入蛋白酶抑制剂和 1 mM PMSF。

对于核染色质蛋白可选择：在 RIPA buffer 中加入 DNase (75- 150 KunitzU/mL)、MgCl<sub>2</sub> (2.5 mM) 、蛋白酶抑制剂和 PMSF (1 mM)

2. 冰上放置 30 分钟，每 10 分钟重悬细胞充分混匀一次。

3. 4°C, 16000x g 离心 10 分钟，将上清液转移到预冷 EP 管中加入 300  $\mu$ L Dilution buffer (Dilution buffer 使用前需要添加蛋白酶抑制剂和 1mM PMSF)，丢弃沉淀（如需，可保存 50  $\mu$ L 稀释的裂解物用于进一步分析，如做为 input 对照）。

注：此步骤获得的细胞溶解物可置于-80°C下保存

## **二、平衡磁珠**

1. 通过移液枪吹吸或上下旋转重悬微珠，将 20  $\mu$ L 的微珠混匀液转移到至 1.5 mL 的离心管中。

2. 加入 500  $\mu\text{L}$  预冷的稀释缓冲液 (Dilution buffer ) , 混匀。
3. 用磁力架分离磁珠, 直到上清变为澄清状态, 丢弃上清液, 并重复清洗 3 次收集磁珠。

### 三、结合蛋白

1. 将收取的细胞裂解物加入到平衡好的磁珠中。 (如需, 可保存 30  $\mu\text{L}$  裂解产物用于免疫印迹分析)
2. 4°C, 上下旋转孵育 1-2 小时。

### 四、洗杂

1. 用磁力架分离磁珠, 直到上清液变为澄清状态。
2. 丢弃剩余上清液。(如需, 可保存 30  $\mu\text{L}$  上清液用于进一步分析(流穿液 / 非结合组分)。
3. 加入 500  $\mu\text{L}$  Dilution buffer 重悬磁珠。
4. 用磁力架分离磁珠, 丢弃剩余上清液。
5. 重复上述洗涤步骤 (步骤 3 和 4) 2-3 次。
6. 洗涤完成后, 将磁珠转移至新的 EP 管中。

**可选** : 清洗液 (Dilution buffer) 可按照需要测试多种盐离子浓度, 如 150 mM-500 mM, 或添加非离子洗涤剂, 如 TritonX-100 (见缓冲液兼容性表中的最大浓度) 。

### 五、洗脱蛋白

#### 5.1 2×SDS loading buffer 洗脱

1. 丢弃剩余上清液。
2. 加入 10~80  $\mu\text{L}$  2xSDS loading buffer 重悬磁珠 (根据样品情况选择 loading buffer 用量) 。
3. 在 95°C以上煮沸水浴 5-10 分钟, 从磁珠上分离免疫复合物。
4. 用磁力架分离磁珠, 丢弃沉淀, 收集上清液。
5. 用 SDS-PAGE 或 WB 分析上清液。

## 5.2 甘氨酸缓冲液洗脱

1. 丢弃剩余上清液。
2. 加入 50–100  $\mu\text{L}$  Glycine-elution buffer (pH2.5), 在 4°C或室温用移液枪吹吸 30 - 60 秒。
3. 用磁力架分离磁珠，丢弃沉淀，收集上清液至新的离心管中。
4. 立即加入 5-10  $\mu\text{L}$  Neutralization buffer (pH10.4) 中和洗脱产物。
5. 重复洗脱步骤 (步骤 2, 3, 4, 5) 2 次以提高洗脱效率。

**注：** 室温洗脱比 4°C效率更高，如靶蛋白较稳定，缓冲液可提前置于室温预热。

## 六、酶活检测/ CHIP/ RIP/ MS 实验步骤

### 6.1 酶活检测

如需进行酶的活性检测，无需洗脱，可以直接检测。

### 6.2 染色质免疫沉积 (CHIP RIP)

如需进行染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验，用于含有 mCherry Tag 融合蛋白的蛋白质/DNA 相互作用实验。染色质免疫沉淀包括细胞固定，染色质断裂，染色质免疫沉淀，交联反应的逆转，DNA 纯化以及 DNA 鉴定。其中细胞固定，染色质断裂步骤不变。然后进入说明书的第二步，加入细胞裂解产物后，DNA-蛋白质复合物结合到平衡好的微珠上。接着进入第三和第四步（结合蛋白，洗涤微珠），分离得到复合物。用甘氨酸缓冲液洗脱，得到洗脱复合物。后期交联反应的逆转，DNA 纯化及 DNA 鉴定等同普通的 ChIP 实验。RNA 结合蛋白免疫沉淀 (RIP) 实验步骤同上。

### 6.3 质谱分析(MS)

mCherry VHH Magarose 不仅用于检测和验证蛋白质之间的相互作用，也可以用于质谱分析筛选与 mCherry Tag 融合蛋白相互作用的蛋白。操作步骤同免疫沉淀法一样，得到洗

脱的复合物后，然后进行 SDS-PAGE 分析，用考马斯亮蓝或者银染的方法染色后，切下未知蛋白的条带，用质谱分析技术鉴定相互作用的蛋白。

**注意事项：**

1. 使用本产品进行实验，需先确认样品中目的蛋白的表达情况。
2. 为了预防目的蛋白降解，请添加合适的蛋白酶抑制剂。
3. 请勿离心或冷冻磁珠，以免引起磁珠聚团，板结。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 本产品不能用于诊断医疗或其它用途仅用于科学实验研究。